

Eczacin®
Eczema Control



••• Adults •••

Reduces Inflammation,
Redness & Itching

dermatology
••• expert



بهترین موارد مصرف کرم آگزام کنترل انکراسین



PHARMED
salamat sina


2th Floor, No. 110-112, First of South Sheikh Bahae
Street, Molla Sadra Street, Vanak, Tehran, Iran

تهران، میدان ونک، خیابان علام‌صدر، نیش خیابان شیخ بهایی
جنوبی، پلاک ۱۱۰-۱۱۲، طبقه ۲

Clinical Trial PHASE II

بررسی ایمنی و کارایی کرم آگزما کنترل آگزاسین، ساخت شرکت فارمد سلامت سینا در بهبود ضایعات پوستی بیماری درماتیت آتوپیک خفیف و متوسط در بزرگسالان

میانگین Local SCORAD در بیماران در بدو ورود ۳ بود که پس از ۲ و ۴ هفته مصرف کرم آگزما کنترل آگزاسین به ترتیب به ۲ و ۱ کاهش یافت. در هر دو مقطع میزان بهبود از نظر آماری معنادار است. (P-value=0.01)



میزان رضایت شرکت‌کنندگان از درمان مورد نظر در جدول زیر نمایش داده شده است. ۲ و ۴ هفته پس از درمان به ترتیب ۸۶/۷٪ (۱۳ نفر از مجموع ۱۵ نفر) و ۷۶/۹٪ (۱۰ نفر از مجموع ۱۳ نفر) ضایعات پوستی خود را "بهبود یافته" یا "بسیار بهبود یافته" توصیف کرده‌اند.

Satisfaction score	Week 2		Week 4	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
worse	0	0	1	7.7
No change	2	13.3	2	15.4
Improved	10	66.7	5	38.5
Much improved	3	20	5	38.5
Total	15	100.0	13	100

شایان ذکر است پروژه تحقیقاتی مذکور در کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران با شناسه IR.TUMS.MEDICINE.REC.1400.926 به تصویب رسیده است.

امروزه استفاده از ترکیبات موثره گیاهی که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی هستند در درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها مورد توجه محققین قرار گرفته است. این مواد به طرق مختلف و به طور موثر از واکنش رادیکال‌های آزاد با لیپیدها و پروتئین‌های سلولی، و تخریب آن‌ها جلوگیری کرده و منجر به تعدیل فعالیت ایمنی، کنترل فرآیند التهابی و بهبود علائم موضعی ناشی از آن می‌شوند.

کرم آگزما کنترل آگزاسین یک کمپلکس گیاهی ضد آگزماست که توسط لابراتوار شرکت هولیستیکا- فرانسه فرموله شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ایمنی و میزان اثربخشی این محصول در بهبود علائم پوستی (SCORAD) بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک خفیف تا متوسط پس از ۲ و ۴ هفته مصرف، طراحی گردیده که توسط شرکت درمالب مستقر در مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام از تاریخ آبان ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در حال اتمام می‌باشد.

تعداد ۲۰ نفر بیمار بالای ۱۸ سال با شدت علائم خفیف تا متوسط (نمره SCORAD پایه در محدوده ۴ الی ۱۰) برای مطالعه در نظر گرفته شدند که تا کنون نتایج ۱۵ نفر تکمیل و آنالیز گردیده است. در این بیماران در بدو ورود به مطالعه، و پس از ۲ و ۴ هفته مصرف کرم آگزما کنترل آگزاسین، Total SCORAD و Local SCORAD و همچنین پارامترهای بیوفیزیکی شامل شاخص‌های رطوبت پوست، میزان تاخیر آب از لایه شاخی TEWL، اریتم، ملانین، دما، سیوم و pH پوست اندازه‌گیری شد. میزان رضایت بیمار از مصرف این کرم نیز ارزیابی و ثبت گردید.

نتایج تحقیقات به عمل آمده بر روی کرم آگزما کنترل آگزاسین به شرح زیر است

میانگین Total SCORAD در بیماران در بدو ورود ۱۳/۴۵ بود که پس از ۲ و ۴ هفته مصرف کرم آگزما کنترل آگزاسین به ترتیب به ۸/۹ و ۷/۴ کاهش یافت. در هر دو مقطع میزان بهبود از نظر آماری معنادار است. (P-value=0.01)

